



## تب خونریزی دهنده کریمه کونگو

گروه هدف: بیمار و همراهان



تاریخ تدوین: ۹۶/۱/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۸/۱/۱۵

شماره بازنگری: ۱

شماره سند: ۴۲p-pH

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

### پیشگیری از بیماری تب کونگو:

۱- گوشت را بعد از تهیه، ۲۴-۱۲ ساعت در یخچال نگهداری کنید و سپس آن را قطعه قطعه کنید زیرا بعد از این زمان عوامل بیماری زای تب کریمه کونگو از بین خواهند رفت.

۲- استفاده از دستکش هنگام قطعه قطعه کردن گوشت

۳- استفاده از دستکش، چکمه، عینک، گان و ماسک جهت قصابان هنگام ذبح دام

منبع: داخلی جراحی



### آدرس:

مشهد - خیابان طبرسی - حد فاصل میدان و چهارراه  
مقدم - بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع) تلفن:

۷-۳۳۶۸۲۱۳۵-۰۵۱

نشانی سایت: [www.jmhc.ir](http://www.jmhc.ir)

### تشخیص:

**مورد مشکوک:** خونریزی، تب، درد عضلانی همراه با سابقه تماس با دام یا کنه یا تماس با انسان بیمار

**مورد محتمل:** کاهش پلاکت (کم تر از ۱۵۰۰۰۰) و کاهش گلبول سفید (کم تر از ۳۰۰۰) یا افزایش گلبول سفید (بیشتر از ۹۰۰۰)

**مورد قطعی:** تست سرو لوژیک مثبت یا جدا کردن ویروس از نمونه خون

**نحوه گزارش دهی:** بلافاصله موارد مشکوک باید به صورت تلفنی به واحد مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود.



## علائم تب کونگو:

علائم اولیه بیماری شامل شروع ناگهانی تب، حال عمومی بد، ضعف، سردرد، تحریک پذیری، درد شدید اندام ها و کمر و بی اشتها می باشد.

استفراغ، درد شکمی و اسهال نیز در بعضی موارد دیده می شود. خونریزی در روز پنجم بیماری شروع می شود. خونریزی زیر پوستی، خونریزی در کام نرم و حلق، خون ریزی از لثه، بینی، ریه، رحم و روده در موارد شدید و کشنده با حجم زیاد و غالباً همراه با تخریب کبدی دیده می شود. تب ۵ الی ۱۲ روز طول می کشد. کاهش ضربان قلب و فشار خون هم دیده می شود. ادرار خونی و آلبومین در ادرار شایع است. کاهش بیش از حد گلبول سفید، افزایش بیش از حد آن و کاهش شدید پلاکت نیز دیده می شود.

## دوره کمون:

دوره کمون بین ۲ تا ۴ هفته می باشد و به طور متوسط ۱۰ روز طول می کشد.

## راه انتقال تب کنگو:

- تماس مستقیم با ترشحات حیوان بیمار هنگام ذبح یا قطعه قطعه کردن گوشت تازه.
- تماس با ترشحات بدن کنه هنگام له کردن آن.
- پاشیده شدن اتفاقی ترشحات حیوان یا انسان بیمار به چشم یا دیگر سطوح مخاطی.

مهم ترین راه آلودگی کنه ناقل بیماری، خون خواری کنه نابالغ از مهره داران کوچک است و یک بار آلودگی موجب می شود کنه در تمام عمر ناقل باشد و بیماری را به مهره داران بزرگ مثل دام ها منتقل کند و انسان به صورت تصادفی بیمار می شود.


با توجه به این که بیماری در حیوانات اهلی هیچ گونه علائم مشخصی ندارد و خطر انتقال بیماری در انسان طی ذبح حیوان آلوده و یا دوره کوتاهی پس از ذبح حیوان آلوده وجود دارد.

این بیماری می تواند از طریق تماس مستقیم انسان با ترشحات گوشت آلوده تازه نیز منتقل شود.

از سوی دیگر به دلیل انتقال بیماری توسط ترشحات بدن انسان بیمار ممکن است به دلیل عدم رعایت احتیاطات استاندارد باعث اپیدمی بیمارستانی شود.



## تب خونریزی دهنده کریمه کونگو (CCHF)



## تعریف بیماری تب کریمه کنگو:

تب های خونریزی دهنده گروهی از بیماری ها هستند که توسط ویروس ها ایجاد می شوند.

یکی از معروف ترین و شایع ترین بیماری ها در این گروه، تب خونریزی دهنده کریمه کونگو است.

این بیماری در آسیا، اروپا و آفریقا وجود دارد و به دلیل مرگ و میر بالا و همه گیری های ناگهانی بیماری، اهمیت خاصی دارد.

این بیماری می تواند از طریق تماس مستقیم انسان با ترشحات گوشت آلوده تازه نیز منتقل شود.