



بیمارستان و زایشگاه جوادالائمه (ع)

Javad Al Aemeh Hospital and Maternity

آشنایی با انسداد روده در نوزادان

(پیچ خوردگی یا تنگی روده)



گروه هدف: والدین نوزاد

شماره سند: JAMH/B-1/PA/01/07

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

واحد آموزش بیمار



Neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant 11th ed 2020. Fanaroff AA and Martin RJ (eds). Mosby-Year Book.

کلینیک سلامت همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۲
پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. داخلی ۲۵۶

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه

مقدم تلفن: ۰۵۱-۳۳۰۱۲

www.jmhc.ir

انواع دیگر انسداد روده مستلزم عمل جراحی است که در این روش گاهی اوقات بخش مسدود شده ی روده برداشته می شود. هرگاه انسداد روده درمان شود و یا فقط بخش کوچکی از روده با عمل جراحی برداشته شود و دلیل آن به نحو موثر درمان شود، می توان رشد طبیعی کودک را انتظار داشت. اما اگر انسداد روده در اثر یک اختلال نهفته باشد (مانند بیماری کرون) ممکن است انسداد مجدد رخ دهد.

مراقبت های بعد از عمل:

- داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک معالج مصرف کنید.
- نیازی به تعویض پانسمان نیست ولی در صورتی که پانسمان خیس و یا کثیف شده به مراکز درمانی مراجعه و پانسمان را تعویض کنید.
- دفع مدفوع و ادرار کودک تان را کنترل کنید.
- در صورت استفراغ سبز رنگ یا تب و یا عدم اجابت مزاج حتما به پزشک مراجعه کنید.

مادر محترم با آرزوی سلامتی برای شما و فرزندتان:

مطالب فوق به منظور آشنایی با انسداد روده در نوزادان تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان بیماری را به خوبی مدیریت نمایید

مسدود شدن جزئی یا کامل روده ی بزرگ و یا روده کوچک را انسداد روده می نامند. در این بیماری عبور غذا از روده مسدود شده و منجر به درد پیچشی در شکم می شود. انسداد روده معمولا باید درمان شود و انسداد کامل روده در صورت عدم درمان، ممکن است کشنده باشد.

علت چیست؟

در کودکان زیر ۲ سال انسداد بیشتر در اثر اختلالی به نام درون کشی (در هم رفتگی) روده ایجاد می شود. اما انسداد روده در نوزادان ممکن است به دلیل فتق یا یک اختلال مادرزادی در روده به وجود آید. دیگر علل احتمالی انسداد روده در کودکان همه ی سنین شامل بیماری کرون (بیماری التهابی روده) و پیچ خوردگی روده می باشد.



علائم احتمالی انسداد روده :

- حمله های متناوب درد شدید در شکم
 - حمله های مایعات استفراغی به رنگ زرد مایل به سبز که تعداد دفعات آن افزایش می یابد.
 - نفخ و ناتوانی در اجابت مزاج که معمولا موجب تسکین موقت درد می شود.
 - وجود مخاط آلوده به خون و ژله مانند روی مدفوع در موارد درون کشی روده. (درون کشی روده عارضه ای است که در آن بخشی از روده به درون بخش دیگری از آن کشیده می شود این عارضه بیشتر در ناحیه ای که روده های بزرگ و کوچک تلاقی دارند رخ می دهد).
 - تب و تورم شکم
- اگر درمان با تاخیر مواجه شود. این احتمال وجود دارد که بخش مسدود شده ی روده پاره شده و منجر به پریتونیت (التهاب جداره ی حفره ی شکمی) شود و یا دچار مرگ و فساد بافتی شود که عارضه ای بالقوه کشنده است.

- یک عارضه ی خطرناک دیگر که ممکن است در اثر استفراغ مکرر ایجاد شود کاهش آب بدن است.

آیا باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر تصور می کنید که کودک شما ممکن است به انسداد روده مبتلا شده باشد به اورژانس زنگ زده و یا او را به نزدیک ترین مرکز فوریت های پزشکی ببرید

پزشک کودک را معاینه خواهد کرد و ممکن است برای جلوگیری از کاهش آب بدن، به او مایعات تزریق شود. برای اطمینان از تشخیص و دریافتن علت انسداد ممکن است رادیوگرافی انجام شود. اگر شک به درون کشی روده وجود داشته باشد ممکن است رادیوگرافی مخصوص با تنقیه ی باریم یا هوا انجام شود. فشار ناشی از تنقیه اغلب بافت جا به جا شده ی روده را به محل درست آن هدایت می کند. اگر تنقیه مشکل را حل نکند عمل جراحی صورت می گیرد.

