



نوزاد مادر دیابتی

گروه هدف: بیمار و همراهیان



تاریخ تدوین: ۹۶/۱/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۷/۸/۱۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱/۱۵

شماره بازنگری: ۴

شماره سند: ۷۹p-pH

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

مراقبت در منزل: والدین بایستی در منزل همکاری و منترل دقیق داشته باشند.

معاینات دوره ای و مراجعه به پزشک برای کنترل لازم است تغذیه صحیح و مکرر و کنترل تحمل تغذیه حتی در نوزادان بدمن علامت باید دقیقا کنترل شود.

به علائمی مثل: بی حالی، خوب شیر نخوردن، تعریق زیاد، اتساع شکم، وجود هرگونه زخم و نیز هرگونه اشکال در تنفس و تپش قلب و تشنج توجه داشته باشید و در صورت بروز این علائم سریعا به پزشک مراجعه شود.

منبع: نلسون



آدرس:

مشهد - خیابان طبرسی - حد فاصل میدان و چهارراه
مقدم - بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع)

تلفن: ۰۵۱-۳۳۶۸۲۱۳۵-۷

نشانی سایت: www.jmhc.ir

بایستی مراقب عفونت های بیمارستانی از جمله عفونت خون و مننژیت و متعاقب آن هیدروسفالی و نیز تشنج بود.

لازم است علائم حیاتی وضعیت قلبی سطح قند خون جذب و دفع مایعات کنترل شود.



با کنترل صحیح در عرض ۴۸ ساعت این عارضه بهبود یافته و از روز دوم به بعد مشکل نوزاد برطرف می شود.

به این نکته توجه شود که از دادن آب قند به نوزاد بایستی پرهیز شود و فقط از شیر به صورت خوراکی استفاده گردد.

پرستاری شامل:

✓ بررسی اولیه عیوب مادر زادی

✓ صدمات زایمانی

✓ علائم مربوط به بیماری های قلبی و تنفسی

✓ حفظ درجه حرارت بدن

✓ شروع زودتر تغذیه

✓ کنترل تحمل تغذیه

✓ کنترل مرتب قند خون



درمان:

این نوزادان را باید قبل از تولد و از طریق کنترل دیابت مادر در دوران بارداری پایش رشد طبیعی جنین آغاز کرد.

شروع درمان براساس سن حاملگی شدت بیماری و تحمل نوزاد می باشد. در نوزادان بدون علامت باید اندازه گیری قند خون ۱ ساعت پس از تولد انجام شود و سپس برای ۶-۸ ساعت اول هر ۱-۲ ساعت و سپس تا ۲۴ ساعت هر ۶ ساعت انجام شود. اگر قند خون نوزاد طبیعی و نرمال باشد تغذیه با شیر مادر می بایست سریع تر انجام شود. در صورتی که نوزاد تغذیه را تحمل ننماید باید سرم تراپی شروع شود.



نوزادان مادران دیابتی و نوزادان مادرانی که در دوران بارداری دچار دیابت می شوند معمولا از نظر شکل ظاهری شبیه یکدیگرند.

این نوزادان در هر زمان که به دنیا بیایند دارای وزن بیشتر از سن حاملگی مادر می باشند. عدم کنترل قند خون با ناهنجاری های مادر زادی مثل ناهنجاری های مادر زادی مثل ناهنجاری های قلب، مغز، نخاع، دستگاه ادراری مرتبط می باشد.

تظاهرات بالینی:

این نوزادان معمولا بزرگ و گوشتالو هستند که این مسئله ناشی از چربی و رشد زیاد استخوان ها و بزرگی اعضای درونی می باشد صورت آن ها پفالود است روزهای اول زندگی نوزاد بی قرار و لرزش دار و تحریک پذیر است. ممکن است گاهی بی حالی و ضعف مکیدن داشته باشد از عوارض شایع در این نوزادان یافت قند خون در ۶ ساعت اول پس از تولد می باشد هرچند در ساعات بعد ممکن است بروز کند.